

Cetral[®]

Cetirizina Diclorhidrato

Vía oral

Antihistamínico

Vía de Administración:

Oral.

Indicaciones:

Tratamiento de rinitis y conjuntivitis estacionales, rinitis alérgica perenne, prurito y urticaria alérgica.

Posología: (Dosis recomendada)

CETRAL[®] 10 mg/ml. Solución Gotas: Niños de 2 a 6 años (0,1 a 0,3 mg/kg/día), sin exceder la dosis de 5 mg/día. Niños mayores de 6 años y adultos: 1 ml (aprox.20 gotas) 1 vez al día (10 mg/día).

CETRAL[®] 5 mg/5 ml. Solución Oral: 10 ml/día (10 mg/día).

CETRAL[®] 10 mg Tabletas: Niños mayores de 6 años y adultos: 10 mg/día.

Advertencias:

No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia, a menos que a criterio médico el balance riesgo/beneficio sea favorable. En caso de ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase temporalmente la lactancia materna mientras dure el tratamiento. No exceda la dosis prescrita.

“Manténgase fuera del alcance de los niños”.

Precauciones:

Este producto puede producir somnolencia, sedación, confusión mental, disminución de la capacidad de concentración mental y capacidad refleja. Evítese actividades que impliquen coordinación y estados de alerta. La ingesta concomitante del alcohol u otros depresores del sistema nervioso central aumentan el riesgo de accidentes. Los bloqueantes H1, interfieren con las pruebas de sensibilidad cutánea, por lo que, previo a la realización de las mismas, debe suspenderse la administración de antihistamínicos.

En pacientes con insuficiencia hepática y/o renal, durante el tratamiento con este producto deben realizarse pruebas de funcionalismo hepático y renal.

Reacciones adversas:

Neurológicas: Mareo, astenia, falta de coordinación, visión borrosa, diplopía, euforia, intranquilidad, insomnio, tic, crisis oculóginas, discinesia, temblor, alucinaciones, agitación, confusión, depresión, cefalea. Gastrointestinales: anorexia, náusea, vómito, estreñimiento o diarrea. Cardiovasculares: Palpitaciones, hipotensión arterial. Otros: Xerostomía, xerausis de fauces y vías respiratorias, tos, polaquiuria, disuria, enuresis.

Interacciones:

Alcohol etílico, teofilina, antidepresivos tricíclicos, barbitúricos y otros depresores del SNC, aumentan la sedación y el riesgo de accidentes.

Contraindicaciones:

En niños menores de 2 años. Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. En pacientes con glaucoma, estenosis pilórica, retención urinaria, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes mellitus.

Presentación:

CETRAL® 10 mg/ml. Solución Gotas: Frasco conteniendo 10ml y gotero calibrado a 0,5 ml.

E.F.: 29.123/16.

CETRAL® 5 mg/5 ml. Solución Oral: Frasco conteniendo 60 ml de Solución Oral. E.F.: 32.977/16

CETRAL® 10 mg Tabletas: Envase blister conteniendo 10 tabletas E.F.: 29.095/16

Conservación del producto:

Consérvese en un lugar fresco y seco protegido de la luz a una temperatura menor a 30°C. No emplear el producto después de la fecha de expiración indicada en el empaque.

Elaborado y distribuido por **Meyer Productos Terapéuticos, S.A.** Caracas-Venezuela.

RIF: J-00025208-4.

Para información y reclamos favor comunicarse al 0800-IGUALES/0800-4482537.

