

Glymar[®]

Glimepirida

Tabletas

Vía de Administración:

Oral.

Indicaciones:

Hipoglicemiante en el tratamiento de la Diabetes Mellitus no insulino dependiente (tipo II). Régimen terapéutico en asociación con metformina, en pacientes con Diabetes Mellitus no insulino dependiente, que no respondan con glimepirida sola, ni a metformina sola.

Posología:

Dosis Inicial: 1 mg/día (con el desayuno). Si es necesario, aumentar gradualmente a intervalos de 1 a 2 semanas en base al monitoreo regular de la glicemia.

Dosis de mantenimiento: 1mg a 4 mg/día.

Dosis máxima: 8 mg /día.

Advertencias:

No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia, a menos que a criterio médico el balance / riesgo beneficio sea favorable. De ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase definitivamente la lactancia materna. No existe una relación exacta entre la dosificación de la glimepirida y la de otros hipoglicemiantes orales, por lo que debe tomarse en cuenta la potencia y duración del efecto hipoglicemiante. No es sustituto de la insulina, ni puede emplearse en todos los tipos de diabetes. Su empleo no excluye el régimen dietético. Este producto no debe administrarse en pacientes con intolerancia a la lactosa o galactosa. No exceda la dosis prescrita. ***"Manténgase fuera del alcance de los niños".***

Precauciones:

Todos los fármacos hipoglicemiantes ó antihiperglicemiantes pueden producir severa reacción de hipoglicemia. El uso de Glimepirida requiere un frecuente monitoreo de cada paciente (tolerancia

glucosada, hemoglobina glicosilada). Pacientes ancianos con disfunción renal y/o hepática, insuficiencia cardíaca y cualquier condición que desencadene aumento del metabolismo anaeróbico.

Efectos adversos:

Oftalmológicas: Disfunción visual transitoria (debido al cambio de glicemia y a la turgencia del cristalino).

Gastrointestinales: Náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal, disfunción hepática (ictericia, colestásis).

Hematológicas: Trombocitopenia, anemia hemolítica, leucopenia.

Otras: Reacción alérgica, shock anafiláctico y disminución de sodio sérico.

Interacciones:

Bloqueantes calcio antagonistas, estatinas, warfarina sódica, antiinflamatorios no esteroideos.

Potencian su efecto: Insulina, inhibidores de la ECA, esteroides, hormonas sexuales masculinas, cloranfenicol, derivados de cumarina, ciclosfosfamida, disopiramida, flenfuramina, feniramidol, fibratos, fluoxetina, guanetidina, ifosfamida, inhibidores de la MAO, miconazol, pentoxifilina, fenilbutazona, quinolonas, salicilatos, sulfonamida, tetraciclina, titociclina, trofosfamida. Disminuyen su efecto: Acetazolamida, barbitúricos, diazóxido, corticoides, diuréticos, epinefrina, glucagón, laxantes, ácido nicotínico (en altas dosis) estrogénos y progestágenos, fenotiazidas, fenitoina, rifampicina, hormonas tiroideas.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula o a otras sulfonilureas, sulfonamidas, insuficiencia hepática y/o renal severa, acidosis de cualquier etiología, discrasias sanguíneas, ictericia (previa o actual).

Presentación:

Glymar® 2 mg tabletas envase blister con 20 tabletas. E.F.: 35.669/20

Glymar® 4 mg tabletas envase blister con 20 tabletas. E.F.: 37.715/23

Conservación del producto:

Consérvese en un lugar fresco y seco protegido de la luz a una temperatura menor a 30°C.

No emplear el producto después de la fecha de expiración indicada en el empaque.

Elaborado y distribuido por **Meyer Productos Terapéuticos, S.A.** Caracas-Venezuela.

RIF: J-00025208-4. Para información y reclamos favor comunicarse al

0800-GUALES/0800-4482537.

