



Imazol[®]

Clotrimazol
1% Crema

Vía de administración: Tópica

Indicaciones: Infecciones dermatológicas causadas por hongos y levaduras. Dermatitis asociada al uso del pañal (pañalitis) causada por *Cándida albicans*.

Posología (Dosis recomendada): Infecciones dermatológicas: Adultos y niños: Una (1) aplicación en la zona afectada 2 veces al día, durante 15 días. Una vez desaparecidas las lesiones, continuar el tratamiento por 10 días más para evitar recaídas.

Dermatitis asociada al uso del pañal (pañalitis): Niños: 2-3 aplicaciones al día.

Dosis máxima diaria: Las dosis recomendadas. El uso en exceso o más frecuente no genera beneficio adicional alguno desde el punto de vista terapéutico y, por el contrario, podría ocasionar eventos adversos.

Modo de empleo:

1. Antes de usar el medicamento lavar y secar bien el área donde será aplicado. Aplicar con masaje suave una capa delgada del producto suficiente para cubrir por completo la zona afectada.

2. Evitar contacto con los ojos.

3. Lavar bien las manos después de cada aplicación.

Reacciones adversas: Reacciones alérgicas: Síncope, hipotensión, disnea, urticaria.

Reacciones dermatológicas: Ardor, irritación, escozor, eritema, prurito, urticaria, descamación, edema, malestar/dolor cutáneo, ampollas.

Interacciones: Debido a su escasa absorción sistémica es poco probable que ello ocurra.

Advertencias y precauciones: Si la infección no mejora o se agrava con el uso del producto, suspéndase el tratamiento y consulte al médico. Si durante el tratamiento se presentan reacciones desfavorables se debe suspender el uso de inmediato. Se recomiendan no exceder de la dosis ni interrumpir el tiempo de tratamiento a menos que el médico lo indique. Si está embarazada consulte el médico antes de usar este producto. Si está en período de lactancia consulte el médico antes de usar este producto.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al clotrimazol, a otros imidazólicos o a los excipientes de la fórmula.

Presentación: Tubo colapsible conteniendo 20 g de crema en estuche.

Venta sin prescripción facultativa. Autorizado por el M.P.P.S bajo el N° E.F.19.679/16

Elaborado y distribuido por: **MEYER PRODUCTOS TERAPÉUTICOS, S.A.**

RIF. J-00025208-4 Caracas -Venezuela.

0800-IGUALES/0800-4482537

A-2105025-03



Imazol[®]

Clotrimazol
1% Crema

Vía de administración: Tópica

Indicaciones: Infecciones dermatológicas causadas por hongos y levaduras. Dermatitis asociada al uso del pañal (pañalitis) causada por *Cándida albicans*.

Posología (Dosis recomendada): Infecciones dermatológicas: Adultos y niños: Una (1) aplicación en la zona afectada 2 veces al día, durante 15 días. Una vez desaparecidas las lesiones, continuar el tratamiento por 10 días más para evitar recaídas.

Dermatitis asociada al uso del pañal (pañalitis): Niños: 2-3 aplicaciones al día.

Dosis máxima diaria: Las dosis recomendadas. El uso en exceso o más frecuente no genera beneficio adicional alguno desde el punto de vista terapéutico y, por el contrario, podría ocasionar eventos adversos.

Modo de empleo:

1. Antes de usar el medicamento lavar y secar bien el área donde será aplicado. Aplicar con masaje suave una capa delgada del producto suficiente para cubrir por completo la zona afectada.

2. Evitar contacto con los ojos.

3. Lavar bien las manos después de cada aplicación.

Reacciones adversas: Reacciones alérgicas: Síncope, hipotensión, disnea, urticaria.

Reacciones dermatológicas: Ardor, irritación, escozor, eritema, prurito, urticaria, descamación, edema, malestar/dolor cutáneo, ampollas.

Interacciones: Debido a su escasa absorción sistémica es poco probable que ello ocurra.

Advertencias y precauciones: Si la infección no mejora o se agrava con el uso del producto, suspéndase el tratamiento y consulte al médico. Si durante el tratamiento se presentan reacciones desfavorables se debe suspender el uso de inmediato. Se recomienda no exceder de la dosis ni interrumpir el tiempo de tratamiento a menos que el médico lo indique. Si está embarazada consulte el médico antes de usar este producto. Si está en período de lactancia consulte el médico antes de usar este producto.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al clotrimazol, a otros imidazólicos o a los excipientes de la fórmula.

Presentación: Tubo colapsible conteniendo 20 g de crema en estuche.

Venta sin prescripción facultativa. Autorizado por el M.P.P.S bajo el N° E.F.19.679/23

Elaborado y distribuido por: MEYER PRODUCTOS TERAPÉUTICOS, S.A.

RIF. J-00025208-4 Caracas -Venezuela.

0800-IGUALES/0800-4482537

A-2105025-05