

Loflox[®]

Lomefloxacin Tabletas Recubiertas

Vía de Administración:

Oral.

Indicaciones:

Tratamiento de las infecciones causadas por gérmenes sensibles a la Lomefloxacin.

Posología:

1 tableta recubierta de 400 mg, cada 24 horas. Ingestión sin relación con las comidas.

Advertencias:

No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el periodo de lactancia. Producto de uso delicado que solo debe ser administrado bajo vigilancia médica.

No exceda la dosis prescrita. ***“Manténgase fuera del alcance de los niños”.***

En caso de presentar malestar gastrointestinal, dolor estomacal, vómitos, diarrea o cualquier otro síntoma, suspéndase su uso y consulte al médico tratante.

El uso prolongado e indiscriminado de este producto puede ocasionar la aparición de gérmenes resistentes. Este producto no debe administrarse en pacientes con intolerancias a la lactosa o galactosa

Precauciones:

Los antiácidos a base de Magnesio y Aluminio no deben ser tomados junto a la administración de Lomefloxacin, ya que altera la absorción de esta última.

Reacciones adversas:

Son leves y transitorias, las más frecuentes son: mareos, diarrea, náuseas y fotosensibilidad.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a la droga o a cualquier quinolona. No se administre en menores de 18 años.

Presentación:

LOFLOX® 400 mg tabletas recubiertas: Envase blister conteniendo 5 ó 10 tabletas recubiertas.

E.F: 28.967/16

Conservación del producto:

Consérvese en un lugar fresco y seco protegido de la luz a una temperatura menor a 30°C.
No emplear el producto después de la fecha de expiración indicada en el empaque.

Elaborado y distribuido por **Meyer Productos Terapéuticos, S.A.** Caracas-Venezuela.

RIF: J-00025208-4.

Para información y reclamos favor comunicarse al 0800-4GUALES/0800-4482537

