

Miconax[®]

Composición: Cada 100 g contienen Metronidazol 15,00 g, Miconazol 4,00 g, Excipientes: Span 60, Tween 60, Emulgín 05, Cera Lanette, Alcohol Bencílico, Cutina C.P, Eutanol G, Titriplex Disódico y agua purificada.

Vía de Administración: Vaginal

Indicaciones: Tratamiento local de la candidiasis vaginal, tricomoniasis vaginal y vaginosis bacteriana.

Posología: Crema: aplicar 5 gramos (1 aplicador lleno) profundamente en la vagina cada noche durante 7 días.

Advertencias: No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche de su existencia, a menos que a criterio médico el balance riesgo/beneficio sea favorable. En caso de ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase temporalmente la lactancia materna mientras dure el tratamiento. No exceda la dosis prescrita. **"Manténgase fuera del alcance de los niños"**.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

Precauciones: En pacientes con disfunción hepática y/o renal severa, enfermedades del sistema nervioso central y periférico, discrasia sanguínea. Por el efecto antabuse ejercido por el metronidazol no ingerir alcohol durante el tratamiento con este producto.

Reacciones Adversas: Locales: Ardor y prurito vaginal. **Neurológicas:** Cefalea, ataxia, convulsiones, vértigos, neuropatía periférica después de uso prolongado. **Dermatológicas:** Eritema. **Hematológicas:** Leucopenia.

Interacciones: Relacionadas al metronidazol: Alcohol, anticoagulantes orales, fenitoína, fenobarbital, cimetidina, litio, astemizol y terfenadina.

Presentación: Crema vaginal: Tubo de 40 g de crema con ocho (08) aplicadores vaginales.

Consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30°C.

Venta con prescripción facultativa.

Registrado en el M.P.P.S. bajo el N° E.F.: 40.057/20 CPE: 1213323005


Elaborado y distribuido por **Meyer Productos Terapéuticos, S.A.** Caracas-Venezuela. RIF: J-00025208-4

Para información y reclamos favor comunicarse al 0800-IGUALES/0800-4482537

Instrucciones de Aplicación



① Extraer cánula aséptica de su empaque.

② Sacar el émbolo hasta el final del cilindro.



③ Destapar el tubo y enrosque el aplicador en la boca del tubo. Enseguida comprimir el tubo desde la parte inferior del mismo hasta que el aplicador quede lleno de crema.

④ Desprender el aplicador y tapan bien el tubo. Introducir el aplicador lleno cuidadosamente y lo más profundamente posible en la vagina. Empujar el émbolo hacia adentro. La aplicación se realiza con mayor facilidad estando acostada de espalda con las piernas separadas y ligeramente flexionadas.



⑤ Retirar el aplicador y desecharlo.