Metren®

Metronidazol

Cápsulas Blandas Vaginales

Indicaciones: Tratamiento de infecciones vaginales causadas por tricomonas.

Posología: METREN® 500 mg Cápsulas Blandas Vaginales: Mujeres adultas: Un cápsula blanda vaginal al día durante 10 días continuos.
Dosis máxima diaria: Las dosis establecidas. El uso de dosis mayores no genera beneficio adicional alguno desde el punto de vista terapéutico y, por el contrario, podría ocasionar efectos adversos.

Vía de Administración: Vaginal.

Modo de empleo:
1. Lavar bien las manos antes de la administración.
2. Acostarse sobre la espalda y flexionar las rodillas.
3. Con el dedo medio introducir profundamente la cápsula blanda en la vagina.
4. Mantener la posición por algunos minutos.
5. Lavar bien las manos después de la administración.
6. Administrar preferiblemente en la noche (antes de dormir).

Advertencias: Con el uso de metronidazol vaginal se ha evidenciado con frecuencia el desarrollo de candidiasis vaginal durante o inmediatamente después de finalizado el tratamiento. En pacientes con disfunción hepática severa el metabolismo del metronidazol se enlentece haciendo posible un incremento de sus concentraciones plasmáticas (con la dosificación continua) y del riesgo de toxicidad. Se recomienda reducir la dosis en estos pacientes y usar con precaución. El metronidazol debe ser usado con precaución en pacientes con historia o presencia de discrasia sanguínea. En pacientes sometidos a tratamiento prolongado o en quienes es necesario repetir el mismo se recomienda la evaluación hematológica previa y posterior, en especial de la fórmula leucocitaria. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia a menos que a criterio médico el balance riesgo beneficio sea favorable, ni durante el período de lactancia.

A-2230502-02

En caso de ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase la lactancia mientras dure el tratamiento. No restablecerla hasta transcurridas 24 horas de finalizado el tratamiento. Se ha relacionado la administración de Metronidazol con actividad mutagénica.
Por el efecto antabuse ejercido por el Metronidazol se recomienda no ingerir alcohol durante el tratamiento con este producto. Durante el tratamiento evite el consumo de alcohol. No exceda la dosis prescrita. A dosis altas y por tiempo prolongado puede producir leucopenia, parestesias y ataxia. Este producto podría debilitar los preservativos y diafragmas de látex y, como resultado, disminuir la eficacia anticonceptiva de éstos. Durante el tratamiento se recomienda evitar las relaciones sexuales. ***"Manténgase fuera del alcance de los niños".***

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al metronidazol, a otros nitroimidazol-derivados o al de los excipientes del producto. Insuficiencia hepática severa.

Efectos Adversos: Generalmente son benignos y transitorios, se han observado trastornos digestivos, tales como nausea, vómito, epigastralgia, diarrea y sabor metálico en la boca. Fenómenos cutáneo-mucosas: prurito, urticaria, rubor, glositis sequedad de la boca. Ocasionalmente puede aparecer una coloración pardo-rojiza en la orina. Cistitis, disuria, poliuria, tenesmo vesical. Neurológicos: vértigos, incoordinación, convulsiones, ataxia, cefalea, irritabilidad. Hematológicos: Neutropenia reversible.

Interacciones: Etanol, Anticoagulantes, Cimetidina, Disulfiram, Fenobarbital, Fenitoina, Medicamentos Neurotóxicos.

Venta Con prescripción facultativa.

Presentación: METREN® 500 mg Cápsulas Blandas Vaginales: Envase blíster contentivo de 10 y 12 Cápsulas Blandas Vaginales. E.F. 29.532/16.

Conservación del Producto: Consérvese en un lugar fresco y seco protegido de la luz a una temperatura inferior a 30ºC. No emplear el producto después de la fecha de expiración indicada en el empaque.

Elaborado y Distribuido por: **Meyer Producto Terapéuticos, S.A**.
RIF. J-00025208-4 Caracas-Venezuela
Para información y reclamos comunicarse al **0800-iguales / 0800-4482537.**

SIEGFRIED

A-2230502-02