Nonafol®

Vía de Administración: Oral.

Indicaciones: En anemia megaloblástica por deficiencia de Ácido Fólico. En tratamientos con quimioterápicos no antagonistas de los Folatos. Tratamiento preventivo de malformaciones del eje neural.

Posología: Tratamiento de la anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico: Adultos y niños: 5 -10 mg/día.

Tratamiento con quimioterápicos no antagonistas de los folatos: Adultos: 5 -10 mg/día.

Dosis máxima: 15 mg/día.

Tratamiento preventivo de la malformación del eje neural: Dosis: 5 mg al día.

Modo de uso: Ingerir con un poco de agua, después o en el intervalo entre comidas.

Advertencias y precauciones: El diagnóstico diferencial de la anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12, de ácido fólico o mixta, es perentorio; ya que el tratamiento de la anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12, tratado con ácido fólico conlleva a complicaciones severas e irreversibles en el área neurológica. Durante el tratamiento deben realizarse controles hematológicos. El ácido fólico no debe administrarse en caso de anemia cuya etiología sea desconocida, dado el riesgo de enmascaramiento de un cuadro de anemia perniciosa.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al Ácido Fólico. Anemia por deficiencia de vitamina B12.

Interacciones: La administración simultánea de ácido fólico y cloranfenicol en pacientes con carencia de folatos puede antagonizar la respuesta hematopoyética al ácido fólico. En los pacientes epilépticos tratados con fenitoína, la terapia con medicamentos que contienen ácido fólico puede aumentar el metabolismo de la fenitoína, disminuir sus concentraciones séricas y aumentar la frecuencia de las crisis convulsivas. Las necesidades de ácido fólico pueden aumentar en los pacientes a los que se administra alguno de esos medicamentos: Metotrexato, trimetoprim, estrógenos, sulfamidas, corticosteroides (uso prolongado) y alcohol.

Reacciones Adversas: eritema, fiebre, prurito, broncoespasmo.

Sobredosis: A dosis usuales, el ácido fólico es bien tolerado por el organismo, no existiendo la posibilidad de intoxicación aguda, crónica o accidental. No se han notificado casos de sobredosis. Cuando se administran dosis elevadas, el ácido fólico se elimina en la orina.

Presentación: Nonafol 10 mg Tabletas: Envase blíster con 10, 20 y 30 Tabletas en estuche de cartón. E.F.: 42.319/19

Conservación del Producto: Consérvese en un lugar fresco y seco protegido de la luz a una temperatura inferior a 30° C. No emplear el producto después de la fecha de expiración indicada en el empaque.

Elaborado y Distribuido por: Meyer Productos Terapéuticos, S.A. RIF: J-00025208-4
Caracas – Venezuela.

Para información y reclamos favor comunicarse al **0800-IGUALES / 08004482537**