



Perten[®]

Clorhidrato de Terbinafina
Tabletas

Composición: Cada Tableta contiene: Terbinafina Clorhidrato 281,31 mg. (Equivalente a terbinafina 250 mg), Excipientes: c.s.

Indicaciones: Adultos: Tratamiento de la onicomicosis. Tratamiento de las micosis superficiales con excepción de la Pitiriasis Versicolor.
Niños: Tratamiento de la Tiña Capitis.

Posología: Adultos: Micosis Superficial: 125 mg/dos veces al día ó 250 mg/una vez al día, por un periodo de 2 semanas hasta 6 meses.
Onicomicosis: 250mg/día durante 12 semanas.
Niños mayores de 6 años: peso entre 20- 40 Kg: 125 mg/día.
Mayores de 40 Kg: 250 mg/día. Durante 4 semanas.

Vía de Administración: Oral.

Advertencias: No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, a menos que a criterio médico, el balance riesgo-beneficio sea favorable. En caso de ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase la lactancia mientras dure el tratamiento.

Precauciones: En pacientes con disfunción hepática y/o renal.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

Reacciones Adversas:

Sistema Nervioso Central: Cefalea.

Gastrointestinales: Náusea, Diarrea, Anorexia, Dolor Abdominal,
Disfunción Hepatobiliar.

Dermatológicas: Exantema y Urticaria. Desarrollo y Exacerbación de Psoriasis,
Pústula Exantematosa Aguda.

Sistema Inmunológico: Precipitación y Exacerbación de Lupus Eritematoso Sistemático y Discoide.

Otras: Artralgias, Mialgias, Trastornos Hematológicos.



Perten[®]

Clorhidrato de Terbinafina
Tabletas

Interacciones: Rifampicina, Cimetidina.

Presentaciones: Estuche blíster con 20 tabletas en estuche de cartón. E.F:41.064/22
CPE 0715367128.

Conservación del Producto: Consérvese en un lugar fresco y seco protegido de la luz, a una temperatura inferior a 30°C. No emplear el producto después de la fecha de expiración indicada en el empaque.

Elaborado y distribuido por: **MEYER PRODUCTOS TERAPÉUTICOS, S.A**
RIF. J-00025208-4.