

Bendamen®

Mebendazol

Tabletas / Suspensión

Vía de Administración:

Oral.

Indicaciones:

Antihelmíntico. Tratamiento de infestaciones producidas por *Ascaris lumbricoides*, *Necator americano*, *Trichuris trichiura* (Tricocéfalos), *Enterobius vermicularis* (Oxiuros) y *Strongyloides*

Posología: (Dosis recomendada)

A juicio del facultativo.

BENDAMEN® 100 mg tabletas: 1 Tableta 2 veces al día, durante 3 días seguidos.

En el tratamiento de la Oxiurasis basta con una dosis única de 100 mg.

BENDAMEN® 100 mg / 5 mL Suspensión: 1 cucharadita (100 mg) de 5 mL 2 veces al día durante 3 días seguidos; para tratar Oxiurasis basta una dosis única de 100 mg (una cucharadita) de 5 mL. Agítese antes de usarse, si no se homogeneiza no se administre.

Advertencias:

Producto de uso delicado que solo debe ser administrado bajo vigilancia médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia. En caso de ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase definitivamente la lactancia materna. No exceda la dosis prescrita. **"Manténgase fuera del alcance de los niños"**.

Reacciones Adversas:

El Mebendazol no ha causado toxicidad sistémica en su uso clínico debido a su escasa absorción a nivel intestinal. En infestaciones masivas han ocurrido diarreas y dolores transitorios. En algunos pacientes tratados con dosis altas se han observado reacciones alérgicas, alopecia y neutropenias reversibles. Cefalea, náusea, vómito, fiebre, erupción cutánea, prurito.

Interacciones:

Carbamazepina, difenilhidantoína.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad conocida a cualquiera de los componentes de la fórmula.

Presentación:

BENDAMEN® 100 mg Tabletas: Envase blister conteniendo 6 tabletas E.F. 21.687/20

BENDAMEN® 100 mg / 5 mL Suspensión: Frasco de vidrio con 30 mL de suspensión.

E.F. 22.165/16.

Conservación del producto:

Consérvese en un lugar fresco y seco protegido de la luz a una temperatura inferior a 30 °C.

No emplear el producto después de la fecha de expiración indicada en el empaque.

Elaborado y distribuido por **Meyer Productos Terapéuticos, S.A.** Caracas-Venezuela.

RIF: J-00025208-4.

Para información y reclamos favor comunicarse al 0800-IGUALES/0800-4482537.

