



Brolat[®]

Loratadina - Ambroxol
Solución oral / Tabletas

Indicaciones: Tratamiento de las afecciones respiratorias que cursan con dificultad para expulsar las secreciones bronquiales asociado a procesos alérgicos.

Posología (Dosis recomendada):

Solución oral: Niños mayores de 2 años con peso menor de 30 Kg: 2,5 mL (Loratadina 2,5 mg – Ambroxol 15 mg) cada 12 horas. Adultos y niños mayores de 2 años con un peso mayor de 30 Kg: 5 mL (Loratadina 5 mg - Ambroxol 30 mg) cada 12 horas.

Tabletas: Adultos y niños mayores de 12 años: Loratadina 5mg- Ambroxol 30 mg cada 12 horas.

Vía de administración: Oral.

Advertencias Solución oral: La fórmula de este producto contiene un derivado del etilenglicol. Estas sustancias tienen efectos depresores del sistema nervioso central, aparato cardiovascular y hemolítico.

Advertencias Tabletas: Si está embarazada o en periodo de lactancia consulte al médico antes de usar este producto. Si los síntomas persisten y no se observa mejoría después de dos o tres días con el uso de este medicamento, suspéndase y consulte al médico. Si presenta palpitaciones o agitación psicomotriz suspéndase y consulte al médico. Este producto puede causar somnolencia, durante su administración evítese actividades que impliquen coordinación y estados de alerta mental. Si usted padece de hipertensión arterial, enfermedad de la glándula tiroides o enfermedad del corazón consulte al médico antes de usar este producto. No exceda la dosis recomendada. Este producto no debe administrarse en pacientes con intolerancia a la Lactosa o Galactosa.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Menores de 2 años. En pacientes con glaucoma, estenosis pilórica, retención urinaria, enfermedades cardíacas congénitas, hipertensión arterial, insuficiencia hepática, hipertiroidismo y diabetes mellitus.



Brolat[®]

Loratadina - Ambroxol
Solución oral / Tabletas

Precauciones: Usar con precaución en ancianos y en pacientes disfunción renal y/o hepática. Pacientes que reciben terapia concomitante con antimicrobianos macrólidos y/o derivados imidazólicos. Al efectuar cualquier tipo de prueba cutánea, suspender aproximadamente 48 antes este producto.

Interacciones: Con depresores del SNC (neurolépticos, Benzodiazepinas, antidepresivos, opiáceos) y con fármacos que potencian los efectos anticolinérgicos (IMAO y antidepresivos tricíclicos), aumentando el efecto sedante.

Reacciones adversas: Neurológicas: Mareo, tinitus, astenia, incoordinación, visión borrosa, euforia, insomnio, temblor y cefalea.

Gastrointestinales: Náuseas, vómito, estreñimiento, diarrea, anorexia.

Otros: Xeroftalmia, tos, disuria, palpitaciones, hipotensión.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Presentaciones:

Brolat 5 mg - 30 mg Solución Oral: Frasco de vidrio con 60 mL con vaso dosificador en estuche de cartón. E.F.: 40.193/20.

Brolat 5 mg - 30 mg Tableta: Envase Blister con 10 tabletas en estuche de cartón. E.F.: 40.082/20.

Conservación del producto: Consérvese en un lugar fresco y seco protegido de la luz, a una temperatura inferior a 30°C. No emplear el producto después de la fecha de expiración indicada en el empaque.

Elaborado y distribuido por **MEYER PRODUCTOS TERAPEUTICOS S.A.**