

Buclen[®]

Clenbuterol

Tabletas / Jarabe / Solución Oral Gotas

Vía de Administración:

Oral.

Indicaciones:

Broncodilatador

Posología: (Dosis recomendada)

BUCLen[®] 20 mcg Tabletas: Adultos y niños mayores de 12 años:

20 mcg – 40 mcg (0,02 mg- 0,04 mg/día).

BUCLen[®] 10 mcg/5 mL Jarabe: Adultos y niños mayores de 12 años:

0,02 mg – 0,04 mg/Kg/día. Niños menores de 12 años: 0,0012 mg/Kg/día.

BUCLen[®] 5 mcg/5 mL Jarabe: Adultos y niños mayores de 12 años:

0,02 mg – 0,04 mg/Kg/día. Niños menores de 12 años: 0,0012 mg/Kg/día.

BUCLen[®] 14 mcg/mL. Solución Oral Gotas “Uso Pediátrico”: Niños: 0,0012 mg/Kg de peso/día.

Advertencias:

Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo vigilancia médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia a menos que el balance riesgo / beneficio sea favorable. En caso de ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase la lactancia materna, mientras dure el tratamiento. No exceda la dosis prescrita. ***“Manténgase fuera del alcance de los niños”.***

Precauciones:

Pacientes con alteración del funcionalismo renal. Infarto reciente del miocardio y estado metabólico diabético. Tratamiento concomitante con simpático-miméticos. Hipertensión arterial.

Reacciones Adversas:

Algunos pacientes sensibles pueden ocasionalmente presentar un ligero temblor en las manos o una leve inquietud que aconseja la reducción de la dosificación. Palpitaciones, taquicardia, intranquilidad, asterixis, cefalea.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al Clenbuterol o a cualquier componente de la fórmula. Insuficiencia renal, hipertiroidismo, feocromocitoma, infarto agudo al miocardio.

Interacciones:

Los fármacos bloqueadores de receptores Beta-adrenérgicos como el Atenolol, inhiben o reducen la acción de los agonistas Beta-adrenérgicos como el Clenbuterol.

Presentación:

BUCLÉN® 20 mcg Tabletas: Envase blister con 10 Tabletas. E.F. 25.721 /16

BUCLÉN® 10 mcg/5 mL. Jarabe: Frasco conteniendo 80 mL. E.F. 27.044/16.

BUCLÉN® 5 mcg/5 mL. Jarabe: Frasco conteniendo 80 mL. E.F. 25.662/16.

BUCLÉN® 14 mcg/mL. Solución Oral Gotas "Uso Pediátrico": Frasco de vidrio, conteniendo 15 mL de Solución oral con gotero calibrado a 0,5 mL. E.F. 32.693/18.

Conservación del producto:

Consérvese en un lugar fresco y seco protegido de la luz a una temperatura inferior a 30°C.

No emplear el producto después de la fecha de expiración indicada en el empaque.

Elaborado y distribuido por **Meyer Productos Terapéuticos, S.A.** Caracas-Venezuela.

RIF: J-00025208-4.

Para información y reclamos favor comunicarse al 0800-IGUALES/0800-4482537.

