

MEDICINA INTERNA



VECTUS[®]

Tadalafil

Siente el poder



Tadalafil tiene efectos mucho más duraderos (de hasta 36h) y te permite utilizar la estrategia de «dosis baja diaria» lo cual supone una ventaja para muchos pacientes que presenta Disfunción eréctil e Hiperplasia benigna de protosta.



Corbis®

Bisoprolol

El Antihipertensivo de Elección

- ♥ **Control de la Hipertensión Arterial eficaz**
- ♥ **Mayor Cardioselectividad que otros Antihipertensivos**
- ♥ **Efecto Cardioprotector**
- 🕒 **Presentaciones con Tabletas Ranuradas**



Productos confiables por su Alta Calidad



Butal[®]

Betahistina

Cuando el mundo te da vueltas

Tratamiento sintomático de la Enfermedad de Ménière

Vértigo, pérdida de la audición, zumbido
y sensación de presión en los oídos.



Gliformín®

Metformina Clorhidrato

Control de la Glicemia
en pacientes Diabéticos tipo 2
con o sin obesidad

1 MES
de
Tratamiento

Gliformín® 1000

Metformina Clorhidrato 1000 mg
30 Tabletas Recubiertas

Gliformín® 850

Metformina Clorhidrato 850 mg
30 Tabletas Recubiertas



Glymar[®]

Glimepirida


El Hipoglicemiante que ofrece Calidad de Vida



● **Aumenta**

**la producción de insulina en el páncreas y
disminuye la resistencia periférica a la insulina.**

Tableta ranurada



**que permite la
Titulación al paciente**

- **Presenta**
Gran afinidad y disociación con su receptor
lo que se traduce en inicio de **Acción rápida con**
pocos eventos hipoglicémicos. (1)



Lipontal®

Gemfibrozil

El tratamiento de elección para la reducción de triglicéridos



Disminuye los Triglicéridos en un 20-50%.⁽¹⁾

Aumenta el HDL entre un 10 - 15%.⁽¹⁾

Disminución del riesgo relativo de enfermedad coronaria en un 78%.⁽²⁾

Indicaciones

- Hipertrigliceridemias primarias y secundarias.
- Síndrome metabólico.
- En la prevención de Cardiopatía Isquémica en pacientes con dislipidemias.
- Diabetes tipo 2 con dislipidemias mixtas.

Posología

- 1 Tableta 30 min antes de la comida principal.



Nortricol[®]

Fenofibrato

Tratamiento de la hipertrigliceridemia grave
con o sin colesterol HDL bajo



**Disminuye los Riesgos de Eventos Cardiovasculares
derivados de la Hipertrigliceridemia**

TRIGLICÉRIDOS



**Mejora la calidad de vida del paciente con
Hipertrigliceridemia**

*La dosis recomendada es de una cápsula de 200 mg
al día administrada al tiempo con una de las comidas.*





La Comunidad
Médica en internet

Más de 25 años de trayectoria apoyando a la comunidad médica

**IntraMed, la comunidad para Médicos
y Profesionales de la salud líder de habla hispana
Contenidos de alto valor y calidad.**

**+ de 25 años online
+1.000.000 usuarios registrados
+ 5.500.000 páginas vistas***

**Cuenta con un Campus Virtual
de educación médica continua**





IntraMed

www.intramed.net

La Comunidad

Médica en internet



AVISO IMPORTANTE.

Este material es de uso exclusivo para el momento de la visita médica por parte del personal de LABORATORIOS SIEGFRIED, S.A. por lo tanto no puede ser reproducido de manera total o parcial, se prohíbe republicarlo en ninguna red social o medio de comunicación masivo, se prohíbe darle uso con otro fin que no sea el descrito, sin la previa autorización escrita por parte de la empresa.

Los conceptos, información y características de los productos aquí descritos son propiedad exclusiva de LABORATORIOS SIEGFRIED, S.A.

