

# NEUMONOLOGÍA



# **Acemuk®**

**Acetilcisteína**

**En pacientes con secreciones mucosas  
anormales o viscosas**

**ACCIÓN MUCOLÍTICA**

**ACCIÓN ANTIOXIDANTE**

**ACCIÓN ANTIINFLAMATORIA**

**Acemuk® (Acetilcisteína) es el tratamiento  
coadyuvante en los procesos respiratorios  
con acción antioxidante.**

**Pulmones sanos = vida sana.**






# MITAR®

*Furoato de Mometasona*

*Tratamiento de los síntomas de la rinitis  
alérgica y sinusitis aguda  
Tratamiento sintomático de la poliposis nasal  
Rinosinusitis aguda.*

*Corticoide Antiinflamatorio y Antialérgico Nasal  
Solución para inhalación Nasal*



RIF: J-00025208-4



Material revisado por la Dirección médica y Farmacéutico patrocinante de Meyer Productos Terapéuticos, S.A. RIF J-00025208-4. Registrado en M.P.P.S Bajo el N° E.F. 41.549/16

# Loflox<sup>®</sup>

Lomefloxacin

**La Quinolona que ofrece el Tratamiento Completo  
y Baja Resistencia Bacteriana**



- Elevada Biodisponibilidad Oral
- Excelente distribución Tisular
- Amplio espectro de actividad Antibacteriana
- Alcanza excelente concentraciones urinarias

**1 Dosis Diaria**

## Indicaciones

- Infecciones del tracto Urinario.
- Infecciones del tracto respiratorio Superior e Inferior.
- Neumonía en Ancianos.
- Sinusitis.

## Posología

- 1 tableta recubierta 400 mg al día.

# Cetral

El antihistamínico que actúa...

Cetirizina

...Así de Rápido



Ideal para tratar reacciones alérgicas en cada miembro de la familia.



**SIN COLORANTE**  
SIN COLORANTE  
SIN COLORANTE

No contiene  
Azúcar

Solución Oral  
y Gotas



**Indicaciones**

- Rinitis Alérgica.
- Urticaria.



# ¿Rinitis Alérgica Urticaria Trastornos Dermatológicos Alérgicos?



**Composición:** Cada 5 mL de solución oral contiene:  
Desloratadina 2,50 mg  
Sacarina Sódica 10 mg  
Sorbitol 70% 900 mg  
Agua purificada c.s.p. 5 mL

**Vía de Administración:** Oral.

**Indicaciones y Posología:** A juicio del facultativo.

**Advertencias:** Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo vigilancia médica. Este producto contiene propilenglicol entre sus excipientes, el cual en dosis altas y por tiempo prolongado tiene efectos depresores del sistema nervioso central, aparato cardiovascular y hemolítico. No administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia a menos que el médico lo indique. No exceda la dosis prescrita. **"Manténgase fuera del alcance de los niños."** Antes de administrar este producto, leer prospecto interno. Este producto puede causar somnolencia. Evítese actividades que impliquen coordinación y estados de alerta.

## Liberdux®

Desloratadina  
2,5 mg / 5 mL  
Solución Oral  
60 mL

Uso Pediátrico

## Liberdux®

Desloratadina  
2,5 mg / 5 mL  
Jarabe  
60 mL

Uso Pediátrico

**Composición:**  
Cada 5 mL de jarabe contiene:  
Desloratadina 2,50 mg  
Sucralosa 7,50 mg  
Sacarosa 1747 mg  
Sorbitol 70% 900 mg  
Agua purificada c.s.p. 5 mL

**Vía de Administración:** Oral.

**Indicaciones y Posología:** A juicio del facultativo.

**Advertencias:** Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo vigilancia médica. Este producto contiene propilenglicol entre sus excipientes, el cual en dosis altas y por tiempo prolongado tiene efectos depresores del sistema nervioso central, aparato cardiovascular y hemolítico. No administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia a menos que el médico lo indique. No exceda la dosis prescrita. **"Manténgase fuera del alcance de los niños."** Antes de administrar este producto, leer prospecto interno. Este producto puede causar somnolencia. Evítese actividades que impliquen coordinación y estados de alerta.

Consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura inferior a 30°C.

**Contraindicaciones:** Alergia a los componentes.

## Liberdux®

Desloratadina 5 mg  
Vía oral

30 Tabletas



00025208-4.

# Tilodrin®

Dextrometorfano

## Calmante de la Tos



- **Sin efectos**

**Secundarios Sedativos**

- **Seguridad Comprobada Adultos y Niños**

- **Excelente Sabor**

### Posología

### Indicaciones

- Antitusígeno en el tratamiento de la tos no productiva.
- Sinusitis.

- Jarabe: Adultos: 15 ml 3 v/día. Niños entre 2 a 6 años: 5 ml 3 v/día. Niños entre 7 a 12 años: 7,5 ml 3 veces al día.
- Solución Gotas: Niños a partir de 2 años: 2 gotas/kg 3 v/día.



**IntraMed**

[www.intramed.net](http://www.intramed.net)

La Comunidad  
Médica en internet

**Más de 25 años de trayectoria apoyando a la comunidad médica**

**IntraMed, la comunidad para Médicos y Profesionales de la salud líder de habla hispana  
Contenidos de alto valor y calidad.**

- + de 25 años online
- +1.000.000 usuarios registrados
- + 5.500.000 páginas vistas\*

**Cuenta con un Campus Virtual de educación médica continua**





# IntraMed

[www.intramed.net](http://www.intramed.net)

La Comunidad  
Médica en internet



# **AVISO IMPORTANTE.**

Este material es de uso exclusivo para el momento de la visita médica por parte del personal de LABORATORIOS SIEGFRIED, S.A. por lo tanto no puede ser reproducido de manera total o parcial, se prohíbe republicarlo en ninguna red social o medio de comunicación masivo, se prohíbe darle uso con otro fin que no sea el descrito, sin la previa autorización escrita por parte de la empresa.

Los conceptos, información y características de los productos aquí descritos son propiedad exclusiva de LABORATORIOS SIEGFRIED, S.A.

