



ORL



Butal[®]

Betahistina

Cuando el mundo te da vueltas

Tratamiento sintomático de la Enfermedad de Ménière

Vértigo, pérdida de la audición, zumbido
y sensación de presión en los oídos.





MITAR[®]

Furoato de Mometasona

*Tratamiento de los síntomas de la rinitis
alérgica y sinusitis aguda*

*Tratamiento sintomático de la poliposis nasal
Rinosinusitis aguda.*

*Corticoide Antiinflamatorio y Antialérgico Nasal
Solución para inhalación Nasal*

Mitar[®]

Mometasona
50 mcg / dosis
Solución para
Inhalación Nasal
120 dosis

RIF: J-00025208-4



Material revisado por la Dirección médica y Farmacéutico patrocinante de
Meyer Productos Terapéuticos, S.A. RIF J-00025208-4. Registrado en M.P.P.S Bajo el N° E.F. 41.549/16



Acemuk®

Acetilcisteína

**En pacientes con secreciones mucosas
anormales o viscosas**

ACCIÓN MUCOLÍTICA

ACCIÓN ANTIOXIDANTE

ACCIÓN ANTIINFLAMATORIA

**Acemuk® (Acetilcisteína) es el tratamiento
coadyuvante en los procesos respiratorios
con acción antioxidante.**

Pulmones sanos = vida sana.



Cetral

Cetirizina

El antihistamínico que actúa...

...Así de Rápido



Ideal para tratar reacciones alérgicas en cada miembro de la familia.



SIN COLORANTE
SIN COLORANTE

No contiene
Azúcar

Solución Oral
y Gotas



Indicaciones


- Rinitis Alérgica.
- Urticaria.



Cetral D

Cetirizina + Pseudoefedrina

**Combina la Rapidez del Antihistamínico,
con una Efectiva Acción Descongestionante**



Antihistamínico

**Doble
Acción**

**Descongestionante
Nasal**

**20
MINUTOS**

**Efectividad
Comprobada**

**SIN COLORANTE
SIN COLORANTE
SIN COLORANTE**

**No contiene
Azúcar**



Indicaciones

- Congestión Nasal.
- Rinorrea.
- Estornudos Frecuentes.
- Conjuntivitis Alérgica.

Posología

- 5-10 ml al día.



¿Rinitis Alérgica Urticaria Trastornos Dermatológicos Alérgicos?



Composición: Cada 5 mL de solución oral contiene:
Desloratadina 2,50 mg
Sacarina Sódica 10 mg
Sorbitol 70% 900 mg
Agua purificada c.s.p. 5 mL

Vía de Administración: Oral.

Indicaciones y Posología: A juicio del facultativo.

Advertencias: Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo vigilancia médica. Este producto contiene propilenglicol entre sus excipientes, el cual en dosis altas y por tiempo prolongado tiene efectos depresores del sistema nervioso central, aparato cardiovascular y hemolítico. No administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia, a menos que el médico lo indique. No exceda la dosis prescrita. "Manténgase fuera del alcance de los niños." Antes de administrar este producto, leer prospecto interno. Este producto puede causar somnolencia. Evite actividades que impliquen coordinación y estados de alerta.

Liberdux®

Desloratadina
2,5 mg / 5 mL
Solución Oral
60 mL

Uso Pediátrico

Liberdux®

Desloratadina
2,5 mg / 5 mL
Jarabe
60 mL

Uso Pediátrico

Composición:
Cada 5 mL de jarabe contiene:
Desloratadina 2,50 mg
Sacarina 7,50 mg
Sorbitol 1747 mg
Sorbitol 70% 900 mg
Agua purificada c.s.p. 5 mL

Vía de Administración: Oral.

Indicaciones y Posología: A juicio del facultativo.

Advertencias: Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo vigilancia médica. Este producto contiene propilenglicol entre sus excipientes, el cual en dosis altas y por tiempo prolongado tiene efectos depresores del sistema nervioso central, aparato cardiovascular y hemolítico. No administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia, a menos que el médico lo indique. No exceda la dosis prescrita. "Manténgase fuera del alcance de los niños." Antes de administrar este producto, leer prospecto interno. Este producto puede causar somnolencia. Evite actividades que impliquen coordinación y estados de alerta.

Consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura inferior a 30°C.

Contraindicaciones: Alergia a los componentes del producto.

Liberdux®

Desloratadina 5 mg
Vía oral
30 Tabletas recubiertas

10025208-4.



Tilodrin®

Dextrometorfano

Calmante de la Tos



- Sin efectos

Secundarios Sedativos

- Seguridad Comprobada Adultos y Niños

- Excelente Sabor

Indicaciones

- Antitusígeno en el tratamiento de la tos no productiva.
- Sinusitis.

Posología

- Jarabe: Adultos: 15 ml 3 v/día. Niños entre 2 a 6 años: 5 ml 3 v/día. Niños entre 7 a 12 años: 7,5 ml 3 veces al día.
- Solución Gotas: Niños a partir de 2 años: 2 gotas/kg 3 v/día.

Benzodiazol[®]

Decualínio + lidocaína

Contra el Dolor de garganta



Benzodiazol[®] está indicado para el alivio de la irritación de garganta y dolores leves asociados a la faringitis.





La Comunidad
Médica en internet

Más de 25 años de trayectoria apoyando a la comunidad médica

**IntraMed, la comunidad para Médicos
y Profesionales de la salud líder de habla hispana
Contenidos de alto valor y calidad.**

**+ de 25 años online
+1.000.000 usuarios registrados
+ 5.500.000 páginas vistas***

**Cuenta con un Campus Virtual
de educación médica continua**





IntraMed

www.intramed.net

La Comunidad

Médica en internet



AVISO IMPORTANTE.

Este material es de uso exclusivo para el momento de la visita médica por parte del personal de LABORATORIOS SIEGFRIED, S.A. por lo tanto no puede ser reproducido de manera total o parcial, se prohíbe republicarlo en ninguna red social o medio de comunicación masivo, se prohíbe darle uso con otro fin que no sea el descrito, sin la previa autorización escrita por parte de la empresa.

Los conceptos, información y características de los productos aquí descritos son propiedad exclusiva de LABORATORIOS SIEGFRIED, S.A.

