

TRAUMATOLOGÍA CIRUGÍA



Ibutancol

Ibuprofeno 600mg / Tiocolchicósido 4mg

Alivia la Contractura Muscular y el Dolor



EFFECTO MIORRELAJANTE

por antagonismo competitivo de los receptores GABA en el sistema nervioso central.

RELAJANTE
no sedante.

Indicaciones

- Cervicalgia
- Lumbalgia
- Dorsalgia
- Hombro doloroso
- Hernia discal

REDUCE

la Contractura Muscular, aliviando el dolor.

Utilizado en el
**TRATAMIENTO DE
PATOLOGIAS MUSCULO
ESQUELETICAS** que cursan con espasmos asociados al dolor.

Posología

- 1 Tableta cada 8 ó 12 Horas.



Tizafen[®]

Tizanidina+ Acetaminofén

Miorrelajante de Acción Central
asociado a **Analgésico**



- ▶ **La eficaz asociación terapéutica Miorrelajante analgésica para reducir radicalmente el ciclo dolor-espasmo-dolor**
- ▶ **En las afecciones musculo esqueléticas de naturaleza aguda y subaguda.**
- ▶ **En ortopedia, traumatología, neurología, medicina general, Cirugía asegurando una rápida recuperación**



EN INFLAMACIÓN Y DOLOR...

Calmox[®]

Meloxicam

ALIVIO Y CONFIANZA



EFFECTIVO, SEGURO Y BIEN TOLERADO EN EL CONTROL DE LA INFLAMACIÓN Y EL DOLOR

Restablece la movilidad articular
garantizándole al paciente la realización de las tareas cotidianas.⁽¹⁾

Baja Incidencia
de efectos adversos gastrointestinales, cardiovasculares y renales.⁽²⁾

Para todo tipo de paciente incluso en edad avanzada.

Indicaciones

- Artritis reumatoide.
- Osteoartritis.
- Lumbalgias.
- Fibromialgia.
- Dolores crónicos de columna.

Posología

- 1 Tableta al día

En Inflamación y Dolor Agudo

Melcox[®]

Meloxicam Inyectable



Directo al sitio de la inflamación y el dolor



Material dirigido exclusivamente al cuerpo médico y farmacéutico.



Quercetol[®]

Etamsilato

El Hemostático Seguro

El Antihemorrágico, Hemostático y Angioprotector

- 🔴 **Fortalece** la resistencia y restaura la permeabilidad capilar
- 🔴 **Previene** la formación de trombos
- 🔴 **Disminuye** el tiempo Quirúrgico - Anestésico
- 🔴 **Reduce** las complicaciones quirúrgicas y los materiales
- 🔴 **Hemostasia** rápida sin el riesgo de efecto hipercoagulante.



CAMPAL[®]

Diclofenac Sódico

DOMINA la Inflamación y el dolor



Buena Absorción Local

Favorece un **Rápido** inicio de acción



Buena Tolerabilidad

Seguro gracias a su eficacia terapéutica comprobada

Indicaciones

- Lumbalgias.
- Dolor e Inflamación postraumática.
- Reumatismo extraarticular.
- Cefaleas crónicas.

Posología

- Tabletas entericas: 50 mg 2 ó 3 veces al día.
- Crema: Aplicar localmente, frotando suavemente de 3 a 4 veces al día.



En inflamación y Dolor Agudo

Artrites

Diclofenac Sódico Inyectable

*Cuando se requiere verdadera potencia
analgesica y antiinflamatoria*

*Eficacia comprobada y sin efectos
narcóticos ni sedantes*

*Mejora la capacidad funcional
del paciente rapidamente*



PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD Y CONFIABLES





IntraMed

www.intramed.net

La Comunidad
Médica en internet

Más de 25 años de trayectoria apoyando a la comunidad médica

**IntraMed, la comunidad para Médicos
y Profesionales de la salud líder de habla hispana
Contenidos de alto valor y calidad.**

- + de 25 años online
- +1.000.000 usuarios registrados
- + 5.500.000 páginas vistas*

**Cuenta con un Campus Virtual
de educación médica continua**





IntraMed

www.intramed.net

La Comunidad

Médica en internet



AVISO IMPORTANTE.

Este material es de uso exclusivo para el momento de la visita médica por parte del personal de LABORATORIOS SIEGFRIED, S.A. por lo tanto no puede ser reproducido de manera total o parcial, se prohíbe republicarlo en ninguna red social o medio de comunicación masivo, se prohíbe darle uso con otro fin que no sea el descrito, sin la previa autorización escrita por parte de la empresa.

Los conceptos, información y características de los productos aquí descritos son propiedad exclusiva de LABORATORIOS SIEGFRIED, S.A.

